

Classes de solos do Município de Uruguaiana

Classe	Descrição	Representatividade	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018
			R\$	R\$	R\$	R\$
I	Vertisolos e chernosolos, solos mais profundos de baixa a média declividade, aptos para cultivo de grãos, grandes culturas, lavouras anuais, agricultura mais intensiva.	Presente em todas as regiões, em menor representatividade em regiões de declividade e encostas íngremes como: Carumbé, Caiboaté de Queimada	7.000	7.000	7.000	7.500
II	Solos em geral pediplanos rasos ou vesiculares, exigem baixa atividade mecânica para uso, que restringe-se a pastagens cultivadas e fruticultura.	Presente na maioria das regiões exceto várzeas e encostas acentuadas	5.600	5.600	5.600	6.000
III	Solos rasos, litólicos com aparecimento de afloramento rochoso, encostas vérticas para uso de pastagens cultivadas, silvicultura e fruticultura com pouca mecanização	Presente em todas as regiões, em menor representatividade em regiões de declividade e encostas íngremes como: Carumbé, Caiboaté de Queimada	4.600	4.600	5.000	5.500
IV	Solos litólicos com afloramento rochoso, pouca profundidade horizonte A.R. Uso para pecuária, pastoreio, exploração de campo nativo, impróprio para atividades que exijam mecanização	Maior representatividade nas regiões do Imbaá, Carumbé, Caiboaté	4.100	4.100	4.500	4.700
V	Área de preservação permanente	Mata, encostas de sangas, arrois e rios	3.800	3.800	4.100	4.700
VI			0	0	0	4.400